

Annexe 3. Liste globale des bryophytes récoltées dans les placettes du niveau 350 m

Hépatiques: 46 espèces

Famille	Espèce
Aneuraceae	<i>Riccardia amazonica</i> (Spruce) V.F. Schiffner ex Gradst. & Hekking <i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle <i>Riccardia sprucei</i> (Stephani) Meenks & C. De Jong
Lejeuneaceae	<i>Anoplolejeunea conferta</i> (Meissn.) A. Evans <i>Archilejeunea parviflora</i> (Nees) Schiffn. <i>Ceratolejeunea ceratantha</i> (Nees et Mont.) Schiffn. <i>Ceratolejeunea cornuta</i> (Lindenb.) Steph. <i>Ceratolejeunea cubensis</i> (Mont.) Schiffn. <i>Ceratolejeunea laetefusca</i> (Austin) R.M. Schust. <i>Cheilolejeunea adnata</i> (Kunze) Grolle <i>Cheilolejeunea trifaria</i> (Reinw., Blume et Nees) Mizut. <i>Cololejeunea diaphana</i> A. Evans <i>Cololejeunea obliqua</i> (Nees et Mont.) Schiffn. <i>Cyclolejeunea convexistipa</i> (Lehm et Lindenb.) A. Evans <i>Diplasiolejeunea caribea</i> Tixier <i>Drepanolejeunea crucianella</i> (Taylor) A. Evans <i>Drepanolejeunea lichenicola</i> (Spruce) Steph. <i>Lejeunea minutiloba</i> A. Evans <i>Lejeunea asperrima</i> Spruce <i>Lejeunea caulicalix</i> (Stephani) M. E. Reiner & Goda <i>Lejeunea cerina</i> (Lehm. et Lindenb.) Gottsche <i>Lejeunea cladogyna</i> A. Evans <i>Lejeunea controversa</i> Gottsche <i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees <i>Lejeunea huctumaltensis</i> Lindend. & Gottsche <i>Lejeunea laetevirens</i> Nees et Mont. <i>Lejeunea minutiloba</i> A. Evans <i>Lejeunea</i> sp. <i>Lopholejeunea nigricans</i> (Lindenb.) Schiffn. <i>Lopholejeunea subfusca</i> (Nees) Schiffn. <i>Prionolejeunea denticulata</i> (Weber) Schiffn. <i>Prionolejeunea cf scabercula</i> (Spruce) Steph. <i>Prionolejeunea guadalupensis</i> (Lindenb.) Steph. <i>Rectolejeunea berteroana</i> (Gottsche ex Steph.) A. Evans <i>Stictolejeunea squamata</i> (Willd. ex Weber) Schiffn. <i>Symbiezidium barbiflorum</i> (Lindenb. et Gottsche) A. Evans <i>Taxilejeunea obtusangula</i> (Spruce) A. Evans
Lepidoziaceae	<i>Telaranea nematodes</i> (Austin) Howe
Metzgeriaceae	<i>Metzgeria albinea</i> Spruce var. <i>albinea</i> <i>Metzgeria cf procera</i> Mitt. <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.
Plagiochilaceae	<i>Plagiochila adiantoides</i> (Sw.) Lindenb. <i>Radula elliotii</i> Castle <i>Radula flaccida</i> Lindenb. et Gottsche <i>Radula javanica</i> Gottsche
Radulaceae	<i>Radula kegelii</i> Gottsche ex Steph.

Mousses: 27 espèces

Famille	Espèce
Calymperaceae	<i>Calymperes afzelii</i> Sw. <i>Calymperes erosum</i> Müll. Hal. <i>Calymperes palisotii</i> Schwägr. <i>Octoblepharum albidum</i> Hedw. <i>Syrrhopodon cymbifolius</i> C. Müller <i>Syrrhopodon incompletus</i> var. <i>berteroanus</i> Mitt.
Daltoniaceae	<i>Leskeodon auratus</i> (Müll. Hal.) Broth.
Fissidentaceae	<i>Fissidens elegans</i> Brid. <i>Fissidens pallidinervis</i> Mitt. <i>Fissidens weirii</i> Mitt. var. <i>hemicraspedophyllus</i> Pursell
Hypnaceae	<i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>rutilans</i> (Brid.) W.R. Buck <i>Vesicularia vesicularis</i> var. <i>vesicularis</i> (Schwägr.) Broth.
Leucomiaceae	<i>Leucomium strumosum</i> (Hornsch.) Mitt.
Neckeraceae	<i>Neckeropsis disticha</i> (Hedw.) Kindb. <i>Neckeropsis undulata</i> (Hedw.) Reichard
Pilotrichaceae	<i>Callicostella belangeriana</i> (Besch.) A. Jaeger <i>Callicostella depressa</i> (Hedw.) A. Jaeger <i>Callicostella pallida</i> (Hornsch.) Ångstr. <i>Hypnella pallescens</i> (Hook.) A. Jaeger <i>Lepidopilum polytrichoides</i> (Hedw.) Brid. <i>Lepidopilum scabrisetum</i> (Schwägr.) Steere <i>Pilotrichum evanescens</i> (Müll. Hal.) Crosby <i>Pilotrichum procerum</i> Mitt.
Pottiaceae	<i>Hyophila involuta</i> (Hook) Jaegr.
Pylaisiadelphaceae	<i>Isopterygium tenerum</i> (Sw.) Mitt. <i>Taxithelium planum</i> (Brid.) Mitt.
Thuidiaceae	<i>Thuidium tomentosum</i> Schimp.