



## Fou brun *Sula leucogaster*



### AUTRES NOMS :

**DESCRIPTION :** bec étroit jaune ou gris jaune, plumage brun foncé sauf sur la poitrine et le ventre où il est blanc ou clair. Les pattes sont jaune ou gris jaune et bleuté vers la pointe. La femelle est plus grande que le mâle. Le juvénile est entièrement brun foncé et plus clair sur le ventre que sur la poitrine. Taille : 71 à 76 cm.

**RÉPARTITION :** Afrique, Asie, Europe, Amérique centrale et du Nord, Amérique du Sud, Océanie

**ÉCOLOGIE :** Il vit près des côtes et sur les îlots déserts et les falaises.

**BIOLOGIE :** Il se reproduit sur les îlots. Son nid est constitué de tiges de pourpiers bord-de-mer (*Sesuvium maritimum*), d'algues et de plumes. La femelle pond 1 ou 2 œufs rarement 3. Ils sont bleutés mais rapidement recouverts d'une couche de calcaire qui leur donne une teinte blanc crayeux. Les deux parents s'occupent de la couvaison pendant 45 jours. Les poussins sont nus à la naissance et peuvent voler après 3 à 4 mois. La femelle et le mâle défendent les œufs et les petits farouchement en restant sur le nid et en menaçant l'intrus du bec.

**PROTECTION / MENACES :** Le Fou brun est protégé par l'Annexe II de la Convention de Carthagène.